SCHEDA RACCOLTA CAMPIONI DI PK (AUC)

Anidulafungina

COGNOME E NOME (o ID): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ **Data di Nascita:** _ _ _ _ _ _ _ _

Peso (Kg): _ _ _ _ _ _ **Altezza (cm):** _ _ _ _ _ _ **Sesso:** Maschio ☐ Femmina ☐

Stato flogistico in corso: SI ☐ NO ☐ **Medico Responsabile:** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data	T	Ora esempio	ORA Effettiva	Provette	Varie Commenti	Visto Lab.
	T 0	8:00		1 Verde 1 Viola		
	Assunzione Anidulafungina mattino	8:10				
	T 1 h (fine infusione)	9:10		1 Verde		
	T 5 h	13:10		1 Verde		
	T 12±4 h	20:00 (16-24)		1 Verde		

Terapia antiinfettiva assunta il giorno precedente la PK					
Farmaco	***Dose (mg)***	***Regime (es. QD, BID, TID)***	***Data (ultima dose, prima dell'inizio dellAUC)***	***Ora della dose (ultima dose, prima dell'inizio dellAUC))***	***Modalità (es.OS, IV)***
Anidulafungina					
Terapia non antiinfettiva assunta durante la PK					
Farmaco	***Dose (mg)***	***Regime (es. QD, BID, TID)***	***Data (ultima dose)***	***Ora della dose (00:00)***	***Modalità (es.OS, IV)***

Altri Farmaci assunti dal paziente:	

1 Provetta verde Vacutainer [LH; Litio Eparina] (7ml): (per dosaggio della Anidulafungina plasmatica) da portare subito in laboratorio (sierare e stoccare a -20°C)
1 Provetta viola Vacutainer [EDTA]; Litio Eparina] (7ml): (per eventuale farmacogenetica) da portare subito in laboratorio (NON sierare, stoccare a –20°C in due aliquote)
Riportare sull' etichetta dell'aliquota: 1) cognome (o ID); 2) data prelievo; 3) T del prelievo

Istruzioni Generali (Antibiotici/Antifungini) [fare riferimento al sito internet per eventuali dubbi www.tdm-torino.org]

Compilare una "Scheda accompagnamento campione TDM" per ciascuna farmacocinetica/paziente o una "Scheda di raccolta campioni PK (AUC)

Compilare una "Scheda raccolta campioni di PK per AUC" per ciascuna farmacocinetica/paziente
Compilare la scheda attentamente in ogni sua parte (si può omettere la compilazione delle zone grigio-scuro):

- Cognome e nome (o sigla identificativa, ID)
- Data di nascita del paziente
- Peso e altezza
- Crocettare se Maschio o Femmina
- Indicare lo stato flogistico o meno
- Segnare il nominativo del Medico Responsabile

- Inserire la data in cui viene effettuata la farmacocinetica
- Inserire l'ora esatta di ciascun prelievo, utilizzando la colonna "ora esempio" (puramente indicativi) come riferimento per le tempistiche.
  - Il prelievo T0 deve essere effettuato come prelievo di "valle" dall'ultima assunzione del farmaco e subito prima della nuova assunzione..
  - Effettuare i prelievi successivi secondo i tempi indicati definiti e concordati preventivamente: esempio: 1, 2, 5, e 9 ore.
- PK - Prelevare al paziente, per ciascun punto della farmacocinetica, 1 provette da 7 ml del tipo Vacutainer LH [tappo verde] (o comunque contenente come anti-coagulante Litio Eparina) per ciascun farmaco da dosare.
  - Le provette devono essere centrifugate entro 10-15 minuti dal prelievo a 1300 g (nelle normali centrifughe utilizzate per sierare dovrebbe corrispondere ad un range di 2500-3000 rpm) per 10 minuti a 4°C.
  - Prelevare il plasma (surnatante), e trasferire non meno di 1 ml di aliquota in ciascuna di 2-3 provette del tipo "crio-vials" (con tappo a vite) precedentemente Identificate/Etichettate con:
    - Cognome o ID del paziente
    - Data del prelievo
    - T (tempo) del prelievo della cinetica.
      - Esempio: Rossi, 25/10/2006, T-2
  - Stoccare immediatamente, le 2-3 aliquote/provette/per farmaco nel congelatore a -20°C sino all'atto della spedizione.
- PG - Prelevare al paziente almeno 1 ml in provette da 7 ml (tappo viola, **EDTA)** per ogni paziente:
  - Non centrifugare le provette ma aliquotare il sangue intero in una provetta del tipo "crio-vials" (con tappo a vite) precedentemente etichettata con:
    - Cognome o ID del paziente
    - Data del prelievo
- Compilare la parte della scheda relativa alla "**Terapia antiinfettiva assunta il giorno precedente la PK**" completando con data e ora dell'ultima dose relativa al farmaci/ci da dosare.
- Compilare la parte della scheda relativa alla "**Terapia non antiinfettiva assunta durante la PK**".
  - Inserire i farmaci assunti dal paziente prima (se nello stesso giorno) e DURANTE l'esecuzione della PK, la dose assunta dal paziente e l'ora dell'assunzione del farmaco.

Per ulteriori informazioni contattare via mail la Dott.ssa Baietto Lorena o il Dott.D'Avolio Antonio all'indirizzo:
info@tdm-torino.org, tdm.torino@yahoo.it

Nota, in particolare, per gli "esterni":
La spedizione di tutti i campioni deve avvenire in un'unica soluzione e giungere al nostro laboratorio nelle giornate di o MARTEDI' o MERCOLEDI' o di GIOVEDI'; I campioni/aliquote, ordinati per paziente e data della cinetica (disposti in un raccoglitore) devono essere inviati, ancora congelati e mantenuti tali con una spedizione "rapida" (entro le 24 ore), in ghiaccio secco ed a temperatura controllata.
Il pacco deve essere inviato all'attenzione di Mauro Sciandra e/o Antonio D'Avolio al seguente indirizzo:
Clinica Universitaria delle Malattie Infettive, Laboratorio di Farmacologia Clinica e Farmacogenetica, Padiglione Q, Ospedale Amedeo di Savoia, C.so Svizzera 164 - 10149 TORINO.
NOTA: Qualche giorno prima di procedere all'invio chiedere conferma della possibile ricezione inviando una e-mail al presente indirizzo: **info@tdm-torino.org, tdm.torino@yahoo.it**

TDM and PK/PG Unit
Università degli Studi di Torino / ASL TO2
Clinica di Malattie Infettive (Direttore Prof. Giovanni Di Perri)
Laboratorio di Farmacologia Clinica e Farmacogenetica, Padiglione Q
Ospedale Amedeo di Savoia, C.so Svizzera 164 - 10149 TORINO (Italy)
Tel. Laboratorio: +39.011.4393867 , Tel Segreteria. +39.011.4393979 , Fax: +39.011.4393882

e-mail: tdm.torino@yahoo.it - info@tdm-torino.org Sito: www.tdm-torino.org
UNI EN ISO 9001:2008 CERTIFIED LABORATORY